

## ВНУТРИПУЗЫРНАЯ ИНСТИЛЛЯЦИЯ препаратов на основе гиалуроната натрия (Уролайф)

Код манипуляции: A11.28.008

A11.28.008.1

### Инструменты для внутрипузырной инстилляции препарата

<b>1</b>	Катеджель (Лидокаин + Хлоргексидин)	1 уп (6 – 10 мл)
<b>2</b>	Спиртовой р-р «Октенисепт»	5 мл
<b>3</b>	Стерильный лоток	1 шт.
<b>4</b>	Стерильный корнцанг	1 шт
<b>5</b>	Стерильные шарики – мушки	упаковка
<b>6</b>	Катетер Нелатона № 8 - 10 <i>(входит в комплект с флаконом препарата)</i>	1 шт
<b>7</b>	Флакон с препаратом - 50 мл <i>(Уролайф)</i>	1 шт
<b>8</b>	Шприц 50 мл <i>(входит в комплект с флаконом препарата)</i>	1 шт
<b>9</b>	Игла 16G или 18G	1 – 2 шт
<b>10</b>	Одноразовая простыня	1 шт

<b>11</b>	Бахилы	1 пара
<b>12</b>	Перчатки стерильные	1 пара

## **ПРОТОКОЛ ВНУТРИПУЗЫРНОЙ ИНСТИЛЛЯЦИИ ПРЕПАРАТА**

Курс: 4 инстилляций 1 раз в неделю, затем еще 4-8 инстилляций 1 раз в 2-4 недели (1-2 раза в месяц)

### **Рекомендации пациентке ПЕРЕД внутрипузырной инстилляцией препарата:**

- Необходимо помочиться перед процедурой

Ход процедуры (ВАЖНО: пациентка должна видеть, что все расходные материалы одноразовые, либо стерильные. Перед процедурой необходимо утилизировать все расходные материалы с предшествующей процедуры):

- 1) Расстелить на гинекологическом кресле стерильную одноразовую простыню
- 2) Пациентке лечь на кресло в литотомической позиции, предварительно сняв нижнее белье и надев бахиллы на ноги
- 3) Медицинской сестре надеть одноразовые стерильные перчатки
- 4) Обработать слизистую преддверия влагалища антисептическим раствором «Октенисепт», просушить ватными шариками
- 5) В уретру ввести 6 - 10 мл Катеджеля с экспозицией 3 - 5 минут для адекватной анестезии и деконтаминации. Запрещается просто смазывать катетер 1-2 мл Катеджеля!!!
- 6) Ввести иглу 16G в флакон с препаратом (возможно подогреть раствор до 37°C под проточной водой), через иглу набрать раствор препарата в шприц! При затруднении с набором препарата можно ввести во флакон 2-ю иглу («воздушку»)

- 7) Снять иглу со шприца
- 8) Подсоединить к шприцу катетер Нелатона
- 9) Ввести наконечник катетера Нелатона на 4-5 см в уретру
- 10) С помощью катетера Нелатона раствор медленно ввести в мочевого пузырь
- 11) Шприц, катетер, перчатки, иглу утилизировать согласно приказу №

**Рекомендации для пациентки ПОСЛЕ проведенной инстилляци:**

- Помочиться через 2-3 ч после процедуры

Необходимо обратиться к врачу в случае появления следующих симптомов:

- Признаков инфекции, включая лихорадку или озноб
- Появления примеси крови в моче
- Других болезненных симптомов.

**Обследование перед внутривузырной инстилляцией препарата:**

1. Клинический анализ мочи – действителен 14 дней
2. Микроскопия отделяемого влагалища (мазок на флору) – анализ действителен 14 дней

**Противопоказания к проведению внутривузырной инстилляци:**

- Симптомы острой инфекции нижних МВП
- Острый вагинит, бактериальный вагиноз
- Признаки герпетической инфекции на слизистой и коже наружных половых органов